

**EGZAMIN MATURALNY
OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015**

**MATEMATYKA
POZIOM PODSTAWOWY**

**ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA
(A1, A2, A3, A4, A6, A7)**

GRUDZIEŃ 2014

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Odpowiedź | D | A | C | D | C | D | B | C | A | B | A | D | C | D | A | B | B | C | D | A | A | C | B | D |

Zadanie 25. (0–2)Rozwiąż nierówność: $-x^2 - 4x + 21 < 0$.


| | |
|--|--|
| II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. | 3.5. Zdający rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. |
|--|--|

RozwiązanieObliczamy miejsca zerowe funkcji kwadratowej $f(x) = -x^2 - 4x + 21$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 21 = 16 + 84 = 100$$

$$\sqrt{\Delta} = 10$$

$$x_1 = \frac{4-10}{-2} = 3 \text{ oraz } x_2 = \frac{4+10}{-2} = -7$$

lub zapisujemy nierówność w postaci $-(x-3)(x+7) < 0$.Szkicujemy fragment wykresu funkcji kwadratowej f i na jego podstawie odczytujemy rozwiązanie nierówności

Odpowiedź: $x \in (-\infty, -7) \cup (3, +\infty)$.

Schemat oceniania

Zdający otrzymuje 1 pkt

jeżeli:

- prawidłowo obliczy pierwiastki trójmianu kwadratowego $x_1 = 3$ oraz $x_2 = -7$ i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy

albo

- rozłoży trójmian kwadratowy $-x^2 - 4x + 21$ na czynniki liniowe i zapisze nierówność $-(x-3)(x+7) < 0$ i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy

albo

- popełni błąd rachunkowy przy obliczaniu pierwiastków trójmianu kwadratowego i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże nierówność

np. $x_1 = \frac{4 - 2\sqrt{17}}{-2} = -2 + \sqrt{17}$ oraz $x_2 = \frac{4 + 2\sqrt{17}}{-2} = -2 - \sqrt{17}$, czyli

$$x \in (-\infty, -2 - \sqrt{17}) \cup (-2 + \sqrt{17}, +\infty).$$

Zdający otrzymuje 2 pkt

jeżeli:

- poda zbiór rozwiązań nierówności w postaci: $(-\infty, -7) \cup (3, +\infty)$ lub $x \in (-\infty, -7) \cup (3, +\infty)$ lub $x < -7 \vee x > 3$

albo

- poda zbiór rozwiązań nierówności w postaci graficznej z poprawnie zaznaczonymi końcami przedziałów:



Uwaga:

Akceptujemy zapis: $x < -7, x > 3$.

Zadanie 26. (0–2)

Uzasadnij, że żadna liczba całkowita nie jest rozwiązaniem równania $\frac{2x+4}{x-2} = 2x+1$.

| | |
|-----------------------------------|--|
| IV. Użycie i tworzenie strategii. | 3.8. Zdający rozwiązuje proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, np. $\frac{x+1}{x+3} = 2$, $\frac{x+1}{x} = 2x$. |
|-----------------------------------|--|

I sposób rozwiązania:

Zauważamy, że $x \neq 2$.

Mnożymy obie strony równania przez $x-2$ i przekształcamy równanie do postaci równania kwadratowego, np. $2x^2 - 5x - 6 = 0$.

Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego, znajdującego się po lewej stronie równania.

$$\Delta = 25 + 48 = 73$$

Zauważamy, że $\sqrt{\Delta} = \sqrt{73}$ jest liczbą niewymierną.

Stwierdzamy, że jeżeli z jednej strony równania występuje trójmian kwadratowy o współczynnikach całkowitych, a z drugiej strony równania liczba zero i $\sqrt{\Delta}$ tego trójmianu kwadratowego jest liczbą niewymierną, to równanie nie ma rozwiązań w zbiorze liczb całkowitych.

II sposób rozwiązania:

Zauważamy, że $x \neq 2$.

Przenosimy wyrażenie z prawej strony równania na lewą i przekształcamy lewą stronę równania do postaci ilorazu.

$$\text{Otrzymujemy } \frac{-2x^2 + 5x + 6}{x-2} = 0$$

Mnożymy obie strony równania przez $x-2$ i otrzymujemy $-2x^2 + 5x + 6 = 0$.

Obliczamy miejsca zerowe funkcji kwadratowej $f(x) = -2x^2 + 5x + 6$.

$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 6 = 25 + 48 = 73$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{73}$$

$$x_1 = \frac{-5 - \sqrt{73}}{-4} = \frac{5 + \sqrt{73}}{4} \text{ oraz } x_2 = \frac{-5 + \sqrt{73}}{-4} = \frac{5 - \sqrt{73}}{4}$$

Zauważamy, że rozwiązania są liczbami niewymiernymi.

Stwierdzamy, że żadna liczba całkowita nie jest rozwiązaniem równania.

Schemat oceniania

Zdający otrzymuje 1 pkt

jeżeli doprowadzi równanie do postaci $ax^2 + bx + c = 0$, np. $2x^2 - 5x - 6 = 0$, i obliczy wyróżnik trójmianu kwadratowego $ax^2 + bx + c$, np. $\Delta = 73$

Zdający otrzymuje 2 pkt

jeżeli poprawnie uzasadni, że równanie $\frac{2x+4}{x-2} = 2x+1$ nie ma rozwiązań w zbiorze liczb całkowitych, np. przez wyznaczenie wszystkich rozwiązań równania i zauważenie, że żadne z rozwiązań nie jest liczbą całkowitą.

Zadanie 27. (0–2)

Czas połowicznego rozpadu pierwiastka to okres, jaki jest potrzebny, by ze 100% pierwiastka pozostało 50% tego pierwiastka. Oznacza to, że ilość pierwiastka pozostała z każdego grama

pierwiastka po x okresach rozpadu połowicznego wyraża się wzorem $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

W przypadku izotopu jodu ^{131}I czas połowicznego rozpadu jest równy 8 dni. Wyznacz najmniejszą liczbę dni, po upływie których pozostanie z 1 g ^{131}I nie więcej niż 0,125 g tego pierwiastka.

Uwaga:

W arkuszach A6, A7 polecenie do zadania ma inne brzmienie: Wyznacz najmniejszą liczbę dni, po upływie których pozostanie z 1 g ^{131}I nie więcej niż 0,125 g tego pierwiastka.

| | |
|--------------------------------|--|
| V. Rozumowanie i argumentacja. | 4.15. Zdający posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym. |
|--------------------------------|--|

I sposób rozwiązania:

Stwierdzamy, że po 8 dniach (czyli po pierwszym okresie połowicznego rozpadu) pozostanie:

$$y(1) = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ (g) pierwiastka.}$$

I dalej, po 16 dniach (czyli po drugim okresie połowicznego rozpadu) pozostanie

$$y(2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ (g) pierwiastka.}$$

Z kolei po 24 dniach (czyli po trzecim okresie połowicznego rozpadu) pozostanie

$$y(3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 0,125 \text{ (g) pierwiastka.}$$

Odpowiedź: Po 24 dniach pozostanie z 1 g ^{131}I nie więcej niż 0,125 g tego pierwiastka.

II sposób rozwiązania;

Ustalamy po ilu okresach rozpadu połowicznego pozostanie 0,125 g pierwiastka.

Rozwiązujemy nierówność $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 0,125$ (lub $\left(\frac{1}{2}\right)^x < 0,125$).

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^3 \quad (\text{lub } \left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^3).$$


$$x \geq 3 \quad (\text{lub } x > 3).$$

Potrzebne są 3 okresy połowicznego rozpadu, czyli $3 \cdot 8 = 24$ dni.

Odpowiedź: Po 24 dniach pozostanie z 1 g ^{131}I nie więcej niż 0,125 g tego pierwiastka.

III sposób rozwiązania:

Szkicujemy wykres funkcji $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.



Z wykresu odczytujemy, że $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 0,125$, gdy $x \geq 3$ (lub że $\left(\frac{1}{2}\right)^x < 0,125$, gdy $x > 3$).

Najmniejszą potrzebną liczbą okresów rozpadu połowicznego jest: 3, zatem najmniejszą szukaną liczbą dni jest: $3 \cdot 8 = 24$.

Odpowiedź: Po 24 dniach pozostanie z 1 g ^{131}I nie więcej niż 0,125 g tego pierwiastka.

Schemat oceniania

Zdający otrzymuje 1 pkt

- jeżeli poprawnie ustali ilość pierwiastka, jaka pozostanie po upływie 16 dni i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy

albo

- gdy poprawnie ustali liczbę okresów rozpadu połowicznego, po których pozostanie 0,125 g pierwiastka i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy

albo

- gdy zapisze nierówność $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^3$ (lub $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \frac{1}{2^3}$, lub $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \frac{1}{8}$, lub $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^3$, lub $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \frac{1}{2^3}$, lub $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \frac{1}{8}$) i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy

albo

- gdy odczyta z wykresu funkcji $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ zbiór argumentów, dla których wartości funkcji są nie większe (mniejsze) od 3.

Zdający otrzymuje 2 pkt

jeżeli obliczy najmniejszą liczbę dni, po upływie których pozostanie z 1 g ^{131}I nie więcej niż 0,125 g tego pierwiastka: 24.

Zadanie 28. (0–2)

Uzasadnij, że jeżeli liczba całkowita nie dzieli się przez 3, to jej kwadrat przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1.

| | |
|--------------------------------|---|
| V. Rozumowanie i argumentacja. | G6.1., 2.1., G6.6. Zdający opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami, używa wzorów skróconego mnożenia na $(a \pm b)^2$ oraz $a^2 - b^2$, wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias. |
|--------------------------------|---|

Rozwiązanie:

Ustalamy, że liczba całkowita k , która nie dzieli się przez 3, daje się zapisać na jeden z dwóch sposobów:

– sposób I (gdy reszta z dzielenia przez 3 jest równa 1): $k = 3n + 1$, gdzie n jest liczbą całkowitą,

– sposób II (gdy reszta z dzielenia przez 3 jest równa 2): $k = 3n + 2$, gdzie n jest liczbą całkowitą.

Przy tych ustaleniach możemy zapisać kwadrat liczby k w zależności od n .

W pierwszym przypadku $k^2 = (3n + 1)^2 = 9n^2 + 6n + 1 = 3(3n^2 + 2n) + 1$.

W drugim przypadku $k^2 = (3n + 2)^2 = 9n^2 + 12n + 4 = 9n^2 + 12n + 3 + 1 = 3(3n^2 + 4n + 1) + 1$

W obu przypadkach liczba k^2 jest sumą liczby podzielnej przez 3 i liczby 1, zatem reszta z dzielenia k^2 przez 3 jest równa 1.

Schemat oceniania

Zdający otrzymuje 1 pkt

- jeżeli w przypadku liczby całkowitej, dla której reszta z dzielenia przez 3 jest równa 1, uzasadni, że reszta z dzielenia kwadratu tej liczby przez 3 jest równa 1 i na tym poprzestanie lub popełni błędy w dalszej części rozumowania

albo

- jeżeli w przypadku liczby całkowitej, dla której reszta z dzielenia przez 3 jest równa 2, uzasadni, że reszta z dzielenia kwadratu tej liczby przez 3 jest równa 1 i na tym poprzestanie lub popełni błędy w dalszej części rozumowania,

albo

- jeżeli przeprowadza uzasadnienie tezy w dwóch przypadkach: kiedy reszta z dzielenia liczby całkowitej przez 3 jest równa 1 oraz kiedy reszta z dzielenia liczby całkowitej przez 3 jest równa 2, ale popełnia błędy w przynajmniej jednym z tych przypadków.

Zdający otrzymuje. 2 pkt

jeżeli przeprowadzi poprawne uzasadnienie faktu: reszta z dzielenia przez 3 kwadratu liczby całkowitej, niepodzielnej przez 3, jest równa 1.

Zadanie 29. (0–2)

Wartość prędkości średniej obliczamy jako iloraz drogi i czasu, w którym ta droga została przebyta. Samochód przejechał z miejscowości A do miejscowości C przez miejscowość B, która znajduje się w połowie drogi z A do C. Wartość prędkości średniej samochodu na trasie z A do B była równa 40 km/h, a na trasie z B do C – 60 km/h. Oblicz wartość prędkości średniej samochodu na całej trasie z A do C.

| | |
|--------------------------------|---|
| V. Rozumowanie i argumentacja. | G6.1., G6.7. Zdający opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związku między różnymi wielkościami, wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych. |
|--------------------------------|---|

I sposób rozwiązania:

Oznaczamy przez s drogę z A do C, przez t_1 czas przejazdu z A do B, a przez t_2 czas przejazdu z B do C.

Z warunków zadania otrzymujemy równania: $40 = \frac{s}{t_1}$ oraz $60 = \frac{s}{t_2}$.

Po przekształceniach wyznaczamy t_1 i t_2 : $t_1 = \frac{s}{80}$ oraz $t_2 = \frac{s}{120}$.

Możemy wyznaczyć średnią prędkość samochodu na drodze z A do C:

$$v = \frac{s}{t_1 + t_2} = \frac{s}{\frac{s}{80} + \frac{s}{120}} = \frac{s}{\frac{3s + 2s}{240}} = \frac{240s}{5s} = 48.$$

Odpowiedź: Wartość średniej prędkości na trasie z A do C jest równa 48 km/h.

II sposób rozwiązania:

Przy podanych średnich prędkościach na dwóch odcinkach drogi, składających się na całą drogę, prędkość średnia na całej drodze jest określona jednoznacznie. Bez straty ogólności możemy założyć, że trasa z A do C ma długość 120 km, wówczas przejazd z A do B trwałby 1,5 h, zaś przejazd z B do C trwałby 1 h.

Możemy wyznaczyć średnią prędkość samochodu na drodze z A do C :

$$v = \frac{120}{1,5+1} = \frac{120}{2,5} = \frac{1200}{25} = 48.$$

Odpowiedź: Wartość średniej prędkości na trasie z A do C jest równa 48 km/h.

Schemat oceniania

Zdający otrzymuje 1 pkt

jeżeli:

- zapisze zależność między średnią prędkością na trasie z A do C a długością drogi

między A i C , np. $v = \frac{s}{\frac{s}{80} + \frac{s}{120}}$.

albo

- przedstawi sposób wyznaczania wartości średniej prędkości na trasie z A do C przy poprawnie przyjętych konkretnych wartościach liczbowych dla drogi i czasu przejazdu

na poszczególnych częściach trasy, np. $v = \frac{120}{1,5+1}$.

Zdający otrzymuje 2 pkt

jeżeli obliczy wartość średniej prędkości na trasie z A do C : 48 km/h.

Uwaga:

Zdający może posłużyć się znaną zależnością między prędkościami średnimi na odcinkach drogi a prędkością średnią na całej drodze i wyznaczyć wartość średniej prędkości przez podstawienie do odpowiedniego wzoru, np. może wykorzystać średnią harmoniczną.

II sposób rozwiązania

Rysujemy kwadraty w 16 wierszach i 16 kolumnach i wykreślamy te kwadraty, dla których numer wiersza jest równy numerowi kolumny. Pozostałe kwadraty odpowiadają jednakowo prawdopodobnym zdarzeniom elementarnym.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | X |

$$|\Omega| = 16 \cdot 15 = 240$$

Zaznaczmy kwadraty, odpowiadające zdarzeniom sprzyjającym zdarzeniu A , które polega na tym, że 2 wylosowane bilety, spośród szesnastu, są biletami na sąsiadujące miejsca.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | X | ! | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ! | X | ! | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | ! | X | ! | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | ! | X | ! | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | ! | X | ! | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | ! | X | ! | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | ! | X | ! | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | ! | X | ! | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | ! | X | ! | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | ! | X | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | X | ! | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | ! | X | ! | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | ! | X | ! | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | ! | X | ! | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | ! | X | ! |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | ! | X |

$$|A| = 28$$

Obliczamy prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A : $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{28}{240} = \frac{7}{60}$.

Schemat oceniania:

Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania – 1 pkt

Zdający

- zapisze liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych: $|\Omega| = 16 \cdot 15$ lub $|\Omega| = 240$

albo

- wypisze zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu A , które polega na tym, że 2 wylosowane bilety, spośród szesnastu, są biletami na sąsiadujące miejsca (np. w postaci tabeli) lub w inny sposób opíše te zdarzenia i na tym zakończy lub dalej popełnia błędy.

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 2 pkt

Zdający zapisze liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych oraz wypisze zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu A (np. w postaci tabeli) lub w inny sposób opíše te zdarzenia.

Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 3 pkt

Zdający zapisze liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych oraz liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A :

$$|\Omega| = 16 \cdot 15 \text{ (lub } |\Omega| = 240), |A| = 9 + 9 + 5 + 5 \text{ (lub } |A| = 28).$$

Rozwiązanie pełne – 4 pkt


Zdający obliczy prawdopodobieństwo zdarzenia A : $P(A) = \frac{7}{60}$.

Uwaga:

Jeśli zdający rozwiąże zadanie do końca i otrzyma $P(A) > 1$, to otrzymuje za całe rozwiązanie 0 punktów.

Zadanie 31. (0–4)

W trapezie $ABCD$ ($AB \parallel CD$) przekątne AC i BD przecinają się w punkcie O takim, że $|AO| : |OC| = 5 : 1$. Pole trójkąta AOD jest równe 10. Uzasadnij, że pole trapezu $ABCD$ jest równe 72.




| | |
|--------------------------------|--|
| V. Rozumowanie i argumentacja. | 7.3., SP11.2. Zdający rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów, oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych. |
|--------------------------------|--|

I sposób rozwiązania:

Trójkąty ABO i CDO są podobne (na podstawie cechy kk).

Jeżeli $|CO| = x$, to $|AO| = 5x$, ponadto $|AB| = 5|CD|$.

Jeżeli wysokość w trójkącie CDO opuszczona na bok CD jest równa h , to wysokość w trójkącie ABO opuszczona na bok AB jest równa $5h$.



Możemy zapisać dwa wzory opisujące pole trójkąta ACD .

- $P_{\Delta ACD} = P_{\Delta AOD} + P_{\Delta CDO} = 10 + P_{\Delta CDO}$
- $P_{\Delta ACD} = \frac{1}{2} \cdot |CD| \cdot (h + 5h) = 3 \cdot |CD| \cdot h = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot |CD| \cdot h = 6P_{\Delta CDO}$

Możemy zatem zapisać równość:

$$6P_{\Delta CDO} = 10 + P_{\Delta CDO}$$

Wobec tego: $5P_{\Delta CDO} = 10$.

$$P_{\Delta CDO} = 2$$

Możemy wyznaczyć pole trójkąta ACD : $P_{\Delta ACD} = 10 + P_{\Delta CDO} = 10 + 2 = 12$.

Obliczmy pole trójkąta ABC .

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot (h + 5h) = 3 \cdot |AB| \cdot h = 3 \cdot 5 \cdot |CD| \cdot h = 30 \cdot \frac{1}{2} \cdot |CD| \cdot h = 30P_{\Delta CDO} = 60$$

Obliczamy pole trapezu $ABCD$.

$$P_{ABCD} = P_{\Delta ACD} + P_{\Delta ABC} = 12 + 60 = 72$$


Zatem wykazaliśmy, że pole trapezu $ABCD$ jest równe 72.

II sposób rozwiązania:

Trójkąty ABO i CDO są podobne (na podstawie cechy kk).

Jeżeli $|CO| = x$, to $|AO| = 5x$, ponadto $|AB| = 5|CD|$.

Jeżeli wysokość w trójkącie CDO opuszczona na bok CD jest równa h , to wysokość w trójkącie ABO opuszczona na bok AB jest równa $5h$.



Możemy zapisać dwa wzory opisujące pole trójkąta ACD .

- $P_{\Delta ABD} = P_{\Delta AOD} + P_{\Delta ABO} = 10 + P_{\Delta ABO} = 10 + \frac{5}{2} \cdot |AB| \cdot h$
- $P_{\Delta ABD} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot (h + 5h) = 3 \cdot |AB| \cdot h$

Możemy zatem zapisać równość:

$$3 \cdot |AB| \cdot h = 10 + \frac{5}{2} \cdot |AB| \cdot h$$

Wobec tego: $0,5 \cdot |AB| \cdot h = 10$.

$$|AB| \cdot h = 20$$

Możemy wyznaczyć pole trójkąta $ABCD$: $P_{\Delta ABD} = 3 \cdot |AB| \cdot h = 3 \cdot 20 = 60$.

Obliczmy pole trójkąta BCD .

$$P_{\Delta BCD} = \frac{1}{2} \cdot |CD| \cdot (h + 5h) = \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{5} \cdot |AB| \cdot h = 0,6 \cdot |AB| \cdot h = 0,6 \cdot 20 = 12$$

Obliczamy pole trapezu $ABCD$.

$$P_{ABCD} = P_{\Delta ABD} + P_{\Delta BCD} = 60 + 12 = 72$$

Zatem wykazaliśmy, że pole trapezu $ABCD$ jest równe 72.

Schemat oceniania

Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania zadania – 1 pkt

- Zapisanie pola trójkąta ACD w zależności od pola trójkąta CDO oraz w zależności od boku CD

albo

- Zapisanie pola trójkąta ABD w zależności od pola trójkąta ADO oraz w zależności od boku AB .

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 2 pkt

- Obliczenie pola trójkąta CDO

albo

- Obliczenie pola trójkąta ABD .

Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 3 pkt

- Zapisanie zależności między polem trójkąta ABC a jedną z podstaw trapezu i wysokością trapezu

albo

- Zapisanie zależności między polem trójkąta BCD a jedną z podstaw trapezu i wysokością trapezu,

albo

- Zapisanie zależności między polami trójkątów ABO i CDO oraz uzasadnienie, że pole trójkąta BCO jest równe 10.

Rozwiązanie pełne – 4 pkt

Przedstawienie poprawnego uzasadnienia, że pole trapezu $ABCD$ jest równe 72.

Zadanie 32. (0–4)

Punkty $A = (3, 3)$ i $B = (9, 1)$ są wierzchołkami trójkąta ABC , a punkt $M = (1, 6)$ jest środkiem boku AC . Oblicz współrzędne punktu przecięcia prostej AB z wysokością tego trójkąta, poprowadzoną z wierzchołka C .

| | |
|-----------------------------------|---|
| IV. Użycie i tworzenie strategii. | 8.1., 8.5., 8.3., 8.4. Zdający wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierunkowej lub ogólnej), wyznacza współrzędne środka odcinka, wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt, oblicza współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych. |
|-----------------------------------|---|

Rozwiązanie:

Wyznamy współrzędne punktu $C = (k, l)$.

Współrzędne punktu M muszą być średnimi arytmetycznymi współrzędnych punktów A i C .

$$\text{Zatem odpowiednio: } 1 = \frac{3+k}{2} \text{ i } 6 = \frac{3+l}{2}$$

Obliczamy k i l .

$$k = -1 \quad l = 9$$

Wyznamy równanie prostej AB .

Współrzędne punktów A i B muszą spełniać równanie tej prostej: $y = ax + b$.

$$\begin{cases} 3 = 3a + b \\ 1 = 9a + b \end{cases}$$

Obliczamy a i b .

$$a = -\frac{1}{3} \quad b = 4$$

Prosta AB ma równanie $y = -\frac{1}{3}x + 4$.

Wyznamy równanie prostej prostopadłej do prostej AB , przechodzącej przez punkt C .

Prosta ta musi mieć równanie postaci $y = 3x + d$.

Punkt C należy do tej prostej, zatem: $9 = -3 + d$.

$$d = 12$$

Szukane równanie prostej ma postać: $y = 3x + 12$.

Wyznamy współrzędne punkt wspólnego dla tej prostej i prostej AB , gdyż jest to punkt przecięcia prostej AB i wysokości trójkąta poprowadzonej z wierzchołka C .

$$\text{Wystarczy rozwiązać układ równań } \begin{cases} y = 3x + 12 \\ y = -\frac{1}{3}x + 4 \end{cases}$$

Szukane współrzędne mają wartości $x = -2, 4$ i $y = 4, 8$.

Schemat oceniania

Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania zadania – 1 pkt

- Wyznaczenie współrzędnych punktu C : $C = (-1, 9)$

albo

- Wyznaczenie równania prostej AB : $y = -\frac{1}{3}x + 4$

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 2 pkt

Wyznaczenie:

współrzędnych punktu C : $C = (-1, 9)$

oraz równania prostej AB : $y = -\frac{1}{3}x + 4$.

Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 3 pkt

Wyznaczenie równania prostej prostopadłej do prostej AB , przechodzącej przez punkt C :

$$y = 3x + 12.$$

Rozwiązanie pełne – 4 pkt

Obliczenie współrzędnych punktu przecięcia prostej AB z wysokością trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka C .


Zadanie 33. (0–4)

Tworząca stożka ma długość 17, a wysokość stożka jest krótsza od średnicy jego podstawy o 22. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego stożka.

| | |
|-------------------------------|--|
| V. Rozumowanie i argumentacja | 3.4., G11.2. Zdający rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą, oblicza pole powierzchni i objętość graniastopuła prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). |
|-------------------------------|--|

Rozwiązanie:

Narysujmy przekrój osiowy stożka i oznaczmy promień podstawy stożka przez r .



Zauważamy, że $2r - 22$ musi być liczbą dodatnią, jako długość odcinka. Zatem r jest większe niż 11.

Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy następującą zależność:

$$(2r - 22)^2 + r^2 = 289$$

$$4r^2 - 88r + 484 + r^2 = 289$$

$$5r^2 - 88r + 195 = 0$$

$$\Delta = 7744 - 3900 = 3844$$

$$\sqrt{\Delta} = 62$$

$$r_1 = \frac{88 - 62}{10} = 2,6 \quad r_2 = \frac{88 + 62}{10} = 15$$

r_1 odrzucamy, bo jest liczbą mniejszą od 11.

Dalsze obliczenia prowadzimy dla przypadku $r = 15$.

Obliczamy wysokość stożka: $2 \cdot 15 - 22 = 8$.

Obliczamy objętość stożka: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 15^2 \cdot 8 = 600\pi$

Obliczamy powierzchnię całkowitą stożka: $P = \pi \cdot 15(15 + 17) = 480\pi$

Schemat oceniania

Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania zadania – 1 pkt

Zapisanie równania z jedną niewiadomą, pozwalającego na wyliczenie długości promienia podstawy stożka lub wysokości stożka, np. $(2r - 22)^2 + r^2 = 289$

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 2 pkt

Rozwiązanie równania kwadratowego w zbiorze liczb rzeczywistych.

Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 3 pkt

Wyznaczenie jedynej możliwej długości promienia podstawy stożka i odrzucenie wartości sprzecznej z warunkami zadania oraz wyznaczenie wysokości stożka: $r = 15$ i $h = 8$

Rozwiązanie pełne – 4 pkt

Poprawne obliczenie objętości i pola powierzchni całkowitej bryły.

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 15^2 \cdot 8 = 600\pi$$

$$P = \pi \cdot 15(15 + 17) = 480\pi$$